

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАССМОТРЕНО:

Цикловая комиссия ДПО
Протокол № 2 от 18.09 2020г

Председатель Р.А. Хачатурова

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ДПО
И.М. Шерозия

18.09 2020г



**СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»**

1. **Абстинентный синдром возникает при**
 - а) хроническом употреблении алкоголя
 - б) прекращении запоя
 - в) передозировке алкоголя
 - г) правильные ответы а, б

2. **Гормоны - это**
 - а) продукты жизнедеятельности всех тканей организма
 - б) медиаторы воспалительного процесса
 - в) продукты секреции экзокринных желез
 - г) продукты секреции эндокринных желез

3. **Летне-осенний подъем заболеваемости имеет**
 - а) дизентерия
 - б) грипп
 - в) бруцеллез
 - г) менингококковая инфекция

4. **"Сосудистые звездочки" на верхней части туловища характерны для**
 - а) панкреатита
 - б) холецистита
 - в) цирроза печени
 - г) язвенной болезни

5. **При остром гломерулонефрите чаще развивается**
 - а) глюкозурия
 - б) дизурия
 - в) олигурия
 - г) полиурия

6. **Такие симптомы, как зуд, жжение, творожистые выделения из половых путей - указывают на**
 - а) эндометрит
 - б) кандидоз
 - в) эктропион шейки матки
 - г) трихомониаз

7. Железодефицитная анемия по цветовому показателю
- а) гиперхромная
 - б) гипохромная
 - в) нормохромная
8. При подозрении на менингококковую инфекцию используется метод лабораторного исследования
- а) бактериологический
 - б) биологический
 - в) серологический
 - г) кожно – аллергический
9. Для профилактики бешенства применяют
- а) антирабическую вакцину – антирабический иммуноглобулин
 - б) антибиотики
 - в) анитоксическую сыворотку
 - г) антирабическую вакцину
10. При переломе бедра в нижней трети иммобилизацию выполняют с фиксацией суставов
- а) тазобедренного и голеностопного
 - б) коленного и голеностопного
 - в) коленного и тазобедренного
 - г) коленного, голеностопного и тазобедренного
11. Антидот при передозировке сердечных гликозидов
- а) унитиол
 - б) атропина сульфат
 - в) налорфин
 - г) бемегрид
12. Глубина продавливания грудины при закрытом массаже сердца взрослому человеку
- а) 2-3 см
 - б) 5-6 см
 - в) 7-8 см
 - г) 3-4 см
13. Для купирования судорожного синдрома у детей применяют
- а) аминазин в/м
 - б) лазикс в/м или в/в
 - в) седуксен в таблетках
 - г) седуксен (диазепам) в/м или в/в
14. Эмпатия - это
- а) постижение эмоционального состояния, переживаний другого человека
 - б) умение манипулировать людьми в своих целях
 - в) способность внушать окружающим свои мысли
15. При оказании неотложной помощи ребенку старше 3 месяцев с гипертермическим синдромом противопоказано
- а) общее согревание, обильное питье водой комнатной температуры
 - б) анальгин, аспирин, амидопирин, нимесулид

- в) парацетамол, ибупрофен
- г) обтирание кожи 40-50° раствором этилового спирта

16. При кашле с гнойной мокротой противопоказан

- а) бромгексин
- б) синскод
- в) мукалтин
- г) амброксол

17. Основной возбудитель хронического гепатита

- а) вирус гепатита А
- б) вирус гепатита В
- в) кишечная палочка
- г) энтерококк

18. Неотложная помощь при гипогликемическом состоянии

- а) ввести глюкагон
- б) ввести препарат инсулина в/в
- в) напоить отваром шиповника
- г) напоить сладким чаем

19. Карантин на детей, имевших контакт с больным корью, составляет (дней)

- а) 7 - 10
- б) 10 - 14
- в) 17 - 21
- г) 22 - 27

20. Тахикардия, экзофтальм, тремор наблюдаются при

- а) гипотиреозе
- б) диффузно – токсическом зобе
- в) сахарном диабете
- г) эндемическом зобе

21. Высокое пульсовое АД наблюдается при

- а) аортальной недостаточности
- б) аортальном стенозе
- в) митральной недостаточности
- г) митральном стенозе

22. При подготовке пациента к анализу кала на скрытую кровь из питания исключают

- а) бобовые, крупы
- б) кисломолочные продукты, молоко
- в) мясо, рыбу
- г) хлеб, хлебобулочные продукты

23. При взятии мазков у пациентки

- а) обтирают содовым раствором влагалищную часть шейки матки
- б) пациентка не должна мочиться в течение 2 часов
- в) массируют уретру
- г) проводят провокацию

24. Повышение температуры, лейкоцитоз, увеличение СОЭ наблюдаются при

- а) гипертоническом кризе
- б) остром инфаркте миокарда
- в) обострении бронхиальной астмы

г) стенокардии напряжения IV функционального класса

25. Большая часть суточной дозы преднизолона должна назначаться

- а) в утренние часы
- б) днем
- в) вечером
- г) на ночь

26. При предстерилизационной обработке инструменты погружают в моющий раствор на

- а) 5 минут
- б) 15 минут
- в) 45 минут
- г) 60 минут

27. Судороги икроножных мышц у беременных чаще указывают на нарушение функции

- а) желудочно-кишечного тракта
- б) сердечно-сосудистой системы
- в) паращитовидных желез
- г) гипоталамо-гипофизарной системы

28. Помощь при острой задержке мочи вследствие аденомы простаты

- а) сухое тепло на низ живота
- б) обильное питье и мочегонные средства
- в) спазмолитические препараты
- г) катетеризация

29. Допустимая потеря крови в родах от массы тела составляет

- а) 1%
- б) 10%
- в) до 0,5%
- г) 5%

30. "Доскообразный" живот наблюдается при

- а) повреждении печени
- б) перфорации язвы желудка
- в) желудочном кровотечении
- г) остром аппендиците

31. Симптом Кохера наблюдается при остром

- а) аппендиците
- б) холецистите
- в) парапроктите
- г) панкреатите

32. Неотложная помощь при консервативном методе лечения почечной колики

- а) антибиотики и катетеризация мочевого пузыря
- б) мочегонные средства и тепло
- в) холод на живот и фурагин
- г) спазмолитики и тепло

33. При остром бронхите кашель с мокротой

- а) розового цвета, пенистого характера

- б) "ржавого" цвета
- в) слизистого характера
- г) стекловидного характера

34. Моча цвета "мясных помоев" обусловлена содержанием большого количества

- а) белка
- б) бактерий
- в) лейкоцитов
- г) эритроцитов

35. Срок забора смывов из носоглотки с целью диагностики гриппа

- а) 1-3 день болезни
- б) 4-5 день болезни
- в) 5-7 день болезни
- г) до 6 часов

36. Ранние симптомы туберкулеза

- а) высокая температура, кровохарканье
- б) высокая температура, кашель с гнойной мокротой
- в) длительный субфебрилитет, покашливание
- г) одышка, "ржавая мокрота"

37. Время обработки рук в растворе С-4 (первомура)

- а) 3 минут
- б) 1 минут
- в) 5 минут
- г) 10 минут

38. Для транспортной иммобилизации используется шина

- а) Кузьминского
- б) Белера
- в) Крамера
- г) ЦИТО

39. Окклюзионную повязку накладывают при

- а) артериальном кровотечении
- б) закрытом переломе нескольких ребер
- в) клапанном пневмотораксе
- г) открытом пневмотораксе

40. Признак эффективности реанимационных мероприятий

- а) отсутствие экскурсии грудной клетки
- б) широкие зрачки
- в) отсутствие пульсовой волны на лучевой артерии
- г) появление пульсовой волны на сонной артерии

41. Достоверные симптомы острого аппендицита

- а) разлитая боль в правой половине живота, дефанс
- б) тошнота, рвота
- в) вздутие живота, задержка газов
- г) симптомы Кохера, Ровзинга, Ситковского

42. **Первичная хирургическая обработка ран относится к антисептике**
- а) химической
 - б) физической
 - в) биологической
 - г) механической
43. **Способ временной остановки наружного артериального кровотечения**
- а) положение давящей повязки
 - б) местное применение холода
 - в) пальцевое прижатие сосуда к кости
 - г) приподнятое положение конечности
44. **При ранениях волосистой части головы накладывается повязка**
- а) крестообразная на затылок и шею
 - б) пращевидная
 - в) "уздечка"
 - г) "чепец"
45. **Выраженная психогенная реакция при онкозаболевании наблюдается в стадии**
- а) диагностической
 - б) начальной
 - в) развернутой
 - г) конечной
46. **Зону некроза на ЭКГ при инфаркте миокарда отражает зубец**
- а) Т
 - б) Q
 - в) R
 - г) S
47. **Желчегонным действием обладает**
- а) бессмертник (цветки)
 - б) календула (цветки)
 - в) крапива (лист)
 - г) подорожник (лист)
48. **Лекарственная растительная смесь при пиелонефрите**
- а) корень алтея, трава душицы
 - б) лист брусники, лист толокнянки
 - в) лист мяты, лист мать-и-мачехи
 - г) лист подорожника, цветки пижмы
49. **Лейкемический "провал" в анализе крови наблюдается при**
- а) гемофилии
 - б) остром лейкозе
 - в) хроническом лимфолейкозе
 - г) хроническом миелолейкозе
50. **Индекс Альговера для оценки тяжести кровопотери - это отношение**
- а) систолического давления к частоте пульса
 - б) частоты пульса к уровню систолического давления

- в) частоты пульса к диастолическому давлению
 - г) диастолического давления к частоте пульса
- 51. Основной признак печеночной комы**
- а) полная утрата сознания и отсутствие рефлексов
 - б) судороги
 - в) возбуждение
 - г) повышение температуры тела до 39°C
- 52. Здоровых новорожденных после рождения прикладывают к груди через**
- а) 15 минут
 - б) 1 час
 - в) 3 часа
 - г) 30 минут
- 53. "Чаша Клойбера" на рентгенограмме характерны для**
- а) разрыва печени
 - б) кишечного кровотечения
 - в) кишечной непроходимости
 - г) перфорации кишечника
- 54. Характерный симптом острого холецистита**
- а) падающей капли
 - б) Мюрнауцкого
 - в) Ситковского
 - г) Ортенера
- 55. Соотношение компрессий грудной клетки к ИВЛ при реанимации взрослому человеку**
- а) 5 компрессий на 1 вдох
 - б) 5 компрессии на 2 вдоха
 - в) 15 компрессий на 1 вдох
 - г) 30 компрессий на 2 вдоха
- 56. Для окончательной остановки кровотечения механическим способом применяют**
- а) наложение жгута
 - б) пузырь со льдом
 - в) сосудистый зажим
 - г) лигирование сосуда
- 57. При легочном кровотечении выделяется кровь**
- а) алого цвета, пенистого характера
 - б) по типу "кофейной гущи"
 - в) багрового цвета, сгустками
 - г) темно-вишневого цвета, без сгустков
- 58. Тройной прием Сафара для обеспечения проходимости дыхательных путей**
- а) положение на спине, голова повернута на бок, нижняя челюсть выдвинута вперед
 - б) запрокидывание головы, открытие рта, выдвижение нижней челюсти
 - в) положение на спине, голова согнута вперед, нижняя челюсть прижата к верхней
 - г) положение на спине, под лопатки подложен валик, нижняя челюсть прижата к верхней
- 59. Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии**
- а) 1-2 минуты

- б) 5-7 минут
- в) 8-10 минут
- г) 25-30 минут

60. Шоковый индекс 1,1 свидетельствует

- а) об отсутствии шока
- б) декомпенсированной обратимой стадии шока
- в) компенсированной стадии шока
- г) декомпенсированной необратимой стадии шока

61. Стул в виде "болотной тины" характерен для

- а) дизентерии
- б) холеры
- в) сальмонеллеза
- г) энтеровирусной инфекции

62. Группу риска при внутрибольничной инфекции представляют

- а) пациенты с хроническими заболеваниями
- б) непривитые дети
- в) пациенты, находящиеся в отделениях интенсивной терапии
- г) пациенты, получающие медицинскую помощь в дневных стационарах

63. При определении размеров газа истинная конъюгата равна (в см)

- а) 20
- б) 15
- в) 11
- г) 13

64. Искусственный аборт — это прерывание беременности на сроке до

- а) 15 недель
- б) 12 недель
- в) 10 недель
- г) 8 недель

65. Общий признак при развитии уремической, травматической и гипотермической ком

- а) сдавление вещества головного мозга
- б) воздействие на головной мозг эндотоксинов
- в) гипоксия головного мозга
- г) длительная стадия возбуждения

66. Признак клапанного пневмоторакса

- а) «свистящая», «плюющая» рана грудной стенки
- б) обширная подкожная эмфизема
- в) костная крепитация при акте дыхания
- г) кровохарканье

67. При лечении стенокардии применяют

- а) аспирин, целанид
- б) аспаркам, дигоксин
- в) дибазол, папаверин
- г) изосорбида динитрат, атенолол

68. Жажда, полиурия, низкая плотность мочи (1000-1003) наблюдаются при
- а) акромегалии
 - б) гипотиреозе
 - в) несахарном диабете
 - г) сахарном диабете
69. Детей, перенесших вирусный гепатит А, наблюдают после выписки из стационара в течение (месяцев)
- а) 2
 - б) 3
 - в) 4
 - г) 5
70. Основным симптомом менингита
- а) ригидность мышц затылка, симптом Кернига
 - б) парез конечностей
 - в) везикулезная сыпь
 - г) геморрагическая сыпь
71. Клинический признак геморрагической лихорадки с почечным синдромом в олигурическом периоде
- а) боль в пояснице
 - б) кашель с мокротой
 - в) озноб
 - г) гипертермический синдром
72. В межприступном периоде бронхиальной астмы применяют
- а) амброксол
 - б) беротек
 - в) интал
 - г) эуфиллин
73. Различают следующие виды медицинской сортировки
- а) диагностическая, эвакуационная
 - б) прогностическая, эвакуотранспортная
 - в) транзитная, эвакуотранспортная
 - г) внутриспунктовая, эвакуотранспортная
74. Ожоговый шок у взрослых может развиваться при ожоге кожи II-III степени
- а) на площади 5-10%
 - б) на площади 10-15%
 - в) на площади 15-20%
 - г) на площади 20% и более
75. Нормальные размеры женского таза (в см)
- а) 22-25-28-18
 - б) 20-23-25-17
 - в) 25-28-31-20
 - г) 28-29-32-15

- 76. Прибавка массы тела за неделю во время беременности составляет**
- а) 300 г
 - б) 500 г
 - в) 600 г
 - г) 1000 г
- 77. Вакцинация БЦЖ новорожденному проводится на**
- а) 1 день
 - б) 3-7 день
 - в) 8 день
 - г) 10 день
- 78. Для профилактики гонобленорей применяется**
- а) 30% раствор сульфацила натрия
 - б) раствор азотнокислого серебра
 - в) 1% раствор сульфацила натрия
 - г) 0,9% раствор натрия хлорида
- 79. Удушье с пенистой розовой мокротой при гипертоническом кризе характерно для**
- а) пневмонии
 - б) легочного кровотечения
 - в) отека легких
 - г) тромбоэмболии легочной артерии
- 80. Функциональный класс стенокардии, при котором приступ боли возникает при нагрузке высокой интенсивности**
- а) первый
 - б) второй
 - в) третий
 - г) четвертый
- 81. Превышение массы тела на 25 % от должной наблюдается при степени ожирения**
- а) 1
 - б) 2
 - в) 3
 - г) 4
- 82. При опущении матки**
- а) дно матки находится на уровне плоскости входа в малый таз
 - б) тело матки находится за пределами половой щели
 - в) внутренний зев матки находится ниже интерспинальной линии
 - г) внутренний зев находится выше интерспинальной линии
- 83. Масса недоношенного плода (в граммах)**
- а) 2700
 - б) 2600
 - в) 5300
 - г) до 2500
- 84. Крепитация выслушивается при**
- а) инфаркте легкого

- б) бронхиальной астме
- в) пневмонии
- г) сухом плеврите

85. Продолжительность инкубационного периода при эпидемическом паротите у детей составляет (дни)

- а) 1 – 10
- б) 11 – 21
- в) 21 – 30
- г) 31 – 40

86. Побочное действие нитроглицерина

- а) расширение коронарных артерий
- б) сужение коронарных артерий
- в) тошнота, рвота
- г) головная боль, гипотензия, рефлекторная тахикардия

87. Ограничения скопления гноя в тканях трактуется как

- а) гидраденит
- б) инфильтрат
- в) абсцесс
- г) флегмона

88. Основной клинический симптом подслизистой миомы матки

- а) боль внизу живота
- б) кровянистые выделения из прямой кишки
- в) меноррагия (гиперменструальный синдром)
- г) длительный субфебрилитет

89. Больным с сопутствующей патологией почек противопоказаны

- а) аминогликозиды
- б) пенициллины
- в) фторхинолоны
- г) тетрациклины

90. Для профилактики кандидоза полости рта при ингаляционном применении глюкокортикостероидов рекомендуют

- а) применение их до еды
- б) применение их сразу после еды
- в) тщательное полоскание рта после ингаляции
- г) пить сок после ингаляции

91. Для профилактики вирусного гепатита "А" контактным необходимо

- а) введение антибиотиков
- б) введение гаммаглобулина, наблюдение 35 дней
- в) наблюдение 45 дней
- г) введение вакцины

92. Основной путь передачи при сибирской язве

- а) контактный
- б) гематогенный
- в) воздушно - капельный
- г) алиментарный

- 93. При холере солевые растворы, используемые для регидратации**
- а) подогревают до температуры тела
 - б) подогревают до 40-42° С
 - в) комнатной температуры
 - г) температурный режим не имеет значения
- 94. Появление шума на верхушке сердца свидетельствует о поражении клапана**
- а) аортального
 - б) митрального
 - в) пульмонального
 - г) трехстворчатого
- 95. При гипертоническом кризе аускультативно отмечается**
- а) ослабление первого тона на верхушке
 - б) ослабление второго тона на верхушке
 - в) акцент второго тона на аорте
 - г) акцент второго тона на легочной артерии
- 96. Прерывание внематочной беременности чаще происходит на сроке**
- а) 10-12 недель
 - б) 2-3 недели
 - в) 5-6 недель
 - г) 8-9 недель
- 97. Прерывание трубной беременности по типу трубного аборта происходит чаще на сроке**
- а) 11-12 недель
 - б) 9-10 недель
 - в) 7-8 недель
 - г) 4-6 недель
- 98. При лечении инфаркта миокарда применяют антикоагулянт прямого действия**
- а) гепарин
 - б) актилизе
 - в) клопидогрел
 - г) аспирин
- 99. Для улучшения реологических свойств крови применяют антиагрегант**
- а) анаприлин
 - б) ацетилсалициловую кислоту
 - в) нифедипин
 - г) нитроглицерин
- 100. При бактериальной дизентерии выделения из кишечника имеют характер**
- а) "болотной тины"
 - б) "ректального плевка"
 - в) "горохового пюре"
 - г) "малинового желе"